

 肉毒桿菌素

還你**年輕自然**的美麗容顏

你也想要變得更美嗎？

請向您的醫師詢問肉毒桿菌素
讓朋友一起見証您的美麗變身！

東**◎**方
美容整型外科

院長 劉宏川

院址：台北市中山北路一段122號2F
諮詢、預約專線
(02) 2523-5225

來自醫學美容世界領導品牌

療診所內衛教使用



肉毒桿菌素

短短十分鐘，
喚醒十年青春！

請認明 100u紫色瓶裝
50u紅色瓶裝

衛生署及美國FDA核准可使用於除皺的肉毒桿菌素

皺眉紋、魚尾紋、抬頭紋 通通不要來！

糾結的眉頭 不經意顯露的抬頭紋
眼周揮不去的角尾紋
讓你看起來像超級壓力鍋
被無情的歲月緊繫束縛了嗎？

只要利用短短幾分鐘施打的肉毒桿菌素注射，
是免動刀的午休美容，
可淡化皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋，
讓數天後的你，眉開眼笑，年輕不只五歲。

你的心聲，請交給肉毒桿菌素，
一起創造美的可能性～

擺脫歲月刻痕的束縛

眉開眼笑，年輕有活力

Helen
43歲

NG!



角尾紋及眼周的老化，讓美人遲暮。

YES!



眼周年輕有朝氣，四十女人一枝花。

皺眉紋

Evy
32歲

NG!



糾結的眉頭，讓秀麗的容顏有黯淡的陰鬱。

YES!



眉宇開朗，就算抿嘴不笑，看起來也可親。

皺眉紋

Apple
34歲

NG!



不自主形成的皺眉紋，易有距離感、不爽朗。

YES!



去除皺眉紋及老化的陰影，不再愁眉深鎖。

魚尾紋

Winnie
41歲

NG!



深深的魚尾紋，滿滿是歲月的刻痕。

魚尾紋

Patty
36歲

NG!



大笑時，眼周細紋及魚尾紋，藏也藏不住。

YES!



只留下淡淡的紋路，笑容自然又燦爛。

YES!



細紋及魚尾紋變淺，光滑的笑臉年輕動人。

抬頭紋

Jean
57歲

NG!



往上看，層層抬頭紋，讓額頭黯淡。

抬頭紋

Sophia
39歲

NG!



提眉時，難以忽略的層層抬頭紋，很搶鏡。

YES!



抬頭紋淡了，額頭明亮又光滑。

YES!



提眉時，少了抬頭紋的干擾，額頭變明亮。

男性除皺

皺眉紋

Eric
31歲

NG!



即使不作表情，兩眉間的皺眉紋深刻。

YES!



皺眉紋不見，愁容減少，年輕很多。

魚尾紋

Charles
30歲

NG!



明顯拉扯的魚尾紋，很難視而不見。

YES!



去除魚尾紋，笑容更加俊俏、有活力。

附註：本衛教手冊個案，以肉毒桿菌素除皺，亦合併使用V*立提長效型玻尿酸治療。



Q&A

Q：肉毒桿菌素，為何能減少皺紋？

A：肉毒桿菌素是從肉毒桿菌分泌物質中，經高科
技純化萃取出來的蛋白質，可讓導致皺紋的肌
肉放鬆，減少肌肉的過度活躍、拉扯，讓皮膚
恢復平滑，同時預防新的皮膚細紋形成。

Q：肉毒桿菌素，對那些皺紋有效？

A：肉毒桿菌素在美容上的用途，主要是治療眼
周的魚尾紋、額頭的抬頭紋、兩眉間的皺眉
紋等等表情紋，以及腋下多汗。

治療時，醫師會用細的針頭，進行注射，治
療時間，大約只須十分鐘。施打時，您可能
會感覺到有如蚊子叮咬的刺痛感。若能保持
愉悅放鬆的心情，可降低情緒上的緊張。

Q：肉毒桿菌素，效果會持續多久？

A：除皺效果約可持續4到6個月。當療效漸漸消
失時，皺紋會慢慢的回復，但不會比未治療
前的皺紋更多，您可每年治療兩到三次，以
維持理想的除皺效果及持久性。

Q：施打後，要注意什麼？

A：建議注射後4小時內，不要按摩注射部位、平
躺或做劇烈運動，以避免藥物擴散到其他非治
療部位，引起不必要的副作用。

治療後3天內，就可以看到皺紋變淡，7到10天
可見到完整的成效，且在一個月內，會持續獲得
改善。建議可於兩周後回診，讓您的主治醫
師檢視治療效果。有極少數人可能會有輕微副
作用，包括：注射部位浮腫或瘀血或複視、眼皮
下垂、眉毛下垂，或頭痛等現象，這些副作用
都是短暫性的，約2~6星期即可逐漸恢復，
請勿太過緊張，請和您的主治醫師保持聯絡，
讓您的主治醫師作適當的處理。

Q & A

Q：肉毒桿菌素，會讓表情不自然？

A：肉毒桿菌素，應經由有經驗的醫師，將適當的劑量，施打在正確的位置上，並不會影響自然的表情，也不會讓你看起來像去拉皮或有臉部僵硬現象，也不會讓人一眼看出您「做了什麼治療」。

Q：肉毒桿菌素，在美容上的使用普遍嗎？

A：肉毒桿菌素，擁有二十年安全使用記錄。根據美國整形外科學會（ASPS）的最新統計，2011年，光是在美國注射肉毒桿菌素的療程，即有570萬例，而玻尿酸美容，也高達130萬例，遠遠超過微晶瓷（28萬多例）及脂肪移植（6萬多例）。

而肉毒桿菌素、玻尿酸美容療程，分佔微整形美容的第一位、第二位，是最被愛美人仕接受、信賴的微整形治療。

Q：打肉毒桿菌素，會讓皺紋變多嗎？

A：不會。未來若您選擇不再接受治療，皺紋只會逐漸回到治療前的程度。

Q：那些人不建議施打肉毒桿菌素？

A：重症肌無力患者、懷孕或哺乳婦女不建議使用；施打期間，不可併用Aminoglycoside（氨基糖苷類抗生素）或 Spectinomycin（觀黴素）；若目前正在使用其他神經肌肉藥物，必須特別謹慎小心，請務必在施打前，告知您的主治醫師。

Q：施打肉毒桿菌素，要注意什麼？

A：本肉毒桿菌素 100u是紫色標籤瓶裝
50u是紅色標籤瓶裝

在施打前，須先依用途稀釋後，再以針筒抽取，施打到正確的位置上。不同來源的肉毒桿菌素，因製程不同，品質差異很大，會影響到治療的效果。

為避免來路不明的肉毒桿菌素，在施打前，消費者一定要留意包裝盒上，是否有衛生署的核可字號，如：「衛署菌疫輸字第*****號」字號，同時建議消費者，前往值得信賴的醫療院所就診。